

Antihistamínicos

* Astemizol

Indicaciones:

- Rinitis Alérgica, Rinitis vasomotora, Rinorrea, Conjuntivitis Alérgica, Fiebre del Heno, Urticaria, Prurito.

Reacciones Adversas:

- Aumento del apetito.

Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral: 10 mg cada 24 horas.
- Niños: Oral: Mayores de 6 años, 2 mg por cada 10 kilos de peso corporal cada 24 h.

* Clorfeniramina

- #### Indicaciones:
- Tratamiento sintomático de rinitis alérgica, rinitis vasomotora, conjuntivitis alérgica, reacciones alérgicas, picaduras de insecto.

Reacciones Adversas:

- Somnolencia, sedación, mareo, incoordinación motora, anorexia, náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento.

Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral: 4 mg cada 4 a 6 hr o bien 12 mg cada 8 a 12 hr.

* Hidroxicina

- #### Indicaciones:
- Prurito, Rinitis Alérgica, Rinitis vasomotora, Rinorrea, Conjuntivitis Alérgica.

Reacciones Adversas:

Somnolencia.

- #### Vías de administración y dosis:
- Oral: Estado de ansiedad o como sedante hipnótico: 10 a 50 mg, como dosis única.
Como Antiemético: 25 a 50 mg dos a tres veces al día.

Antiflogísticos

Antiflogísticos

Losifloxa

*** Ácido Acetilsalicílico**

Indicaciones: Dolor de baja y moderada intensidad, en especial en caso de cefalea, neuralgia, migraña, artalgia y dismenorrea. Procesos inflamatorios como fiebre reumática, artritis reumatoide y osteoartritis.

Reacciones Adversas:

- Náuseas, vómito, sangrado gástrico o intestinal, prolongación en tiempo de sangrado.

Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral, como analgésico y antipirético, 325 a 650 mg cada 4 hr. Como antirreumático, 1 a 1.25 gr cada 6 horas. Fiebre reumática aguda, 1 a 1.25 gr cada 4 horas.
- Niños: Oral, como analgésico y como antipirético, dos a cuatro años: 160 mg; de cuatro a seis años: 240 mg; de seis a nueve años: 320 mg

*** Diclofenaco**

Indicaciones: Artritis reumatoide. Espondiloartritis anquilosante. Artrosis. Espondiloartritis.

Reacciones Adversas:

- Náuseas, vómito, dolor abdominal, eructos, prurito, erupción cutánea.

Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral, 100 mg al día en una dosis o fraccionado en dos tomas de 50 mg, Rectal, supositorio de 100 mg, en la noche o en la mañana.

* Flurbiprofeno

1 Indicaciones: Artritis reumatoide, osteoartritis, espondilitis anquilizante, bursitis, tendinitis, lesión de tejidos blandos, dismenorrea.

1 Reacciones adversas: Náuseas, indigestión, dolor abdominal, diarrea, retención de líquidos.

1 Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral, Osteoartritis; inicial de 200 a 300 mg al día en dosis divididas, cada 4 a 6 h (50 mg).

Broncodilatadores

* Teofilina

1 Indicaciones: Asma bronquial, bronquitis crónica, enfisema (tratamiento crónico).

1 Reacciones adversas:

- Con dosis alta, signos y síntomas de alteración del sistema nervioso central y cardiovasculares.

1 Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral, inicial, 100 mg al día, dosis máxima 900 mg al día.
- Niños: Oral, menores de 12 años, no existe la formulación farmacéutica.

* Ipratropio

1 Indicaciones: Enfermedad pulmonar obstructiva, bronquitis crónica, enfisema y asma bronquial no controlada con antagonista adrenérgico beta.

1 Reacciones adversas: Xerofomatia, tos, sabor amargo, náuseas, molestia abdominal, cefalea, nerviosismo.

1 Vía de administración y dosis

- Adultos: Inhalación, 40 mcg (2 aplicaciones) 4 vxd.
- Niños: Inhalación, mayores de 12 años, 20 a 40 mcg (1 a 2 aplicaciones) 3 vxd.

* Tiotropio

Indicaciones: Tratamiento sintomático de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Reacciones adversas:

- Xerofomía

Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral por inhalación. 18 mcg una vez al día mediante la utilización del inhalador.

* Analgésicos

* Ácido Acetilgálico

Indicaciones: Dolor de baja y moderada intensidad, en especial en casos de cefalea, neuralgia, migraña, artralgia y dismenorrea.

Reacciones Adversas:

- Náuseas, vómito, sangrado gástrico o intestinal, prolongación en tiempo de sangrado.

Vía de administración y dosis:

- Adultos: Como analgésico y antipirético: 325 o 650 mg cada 4 h.

- Niños: Como analgésico y antipirético: 160 mg.

* Ácido Mefenámico

Indicaciones: Dolor de baja y moderada intensidad. Dismenorrea.

Reacciones Adversas:

- Molestias y dolor abdominal, diarrea y náuseas.

Vía de administración y dosis:

- Adultos: Oral, inicial, 500 mg; después, 250 mg cada 6 h.

- Niños: Oral. Para mayores de 14 años.

* Benidamina

1 Indicaciones: Dolor e inflamación del sistema musculoesquelético, mucosa y tejidos blandos.

1 Reacciones Adversas:

- Eritema, erupción cutánea, prurito, irritación, dermatitis de contacto.

1 Via de administración y dosis:

- Adultos: Tópica de la piel, gel o crema, dos a cuatro veces al día.

Antibióticos

* Penicilina

* Tetraciclinas

* Cefalosporina

* Penicilina

1 Indicaciones: Se utiliza para tratar infecciones relacionadas con bacterias.

1 Reacciones adversas:

- Diarrea leve.
- Dolor de cabeza.
- Dolor en la boca y en la lengua.
- Comezón y la secreción vaginal.
- Manchas blancas en la lengua.

* Tetraciclinas

1 Indicaciones: Se utiliza para tratar infecciones provocadas por bacterias.

1 Reacciones adversas:

- Malestar estomacal.
- Diarrea.
- Picazón en el recto o vagina.
- Dolor en la boca.
- Cambios de color de la piel.

1 Vía de administración y dosis:

- En forma de cápsulas, se toma de 2 a 4 veces al día, se debe tomar con el estómago vacío.

* Cefalosporina

1 Indicaciones: Medicamentos utilizados para el tratamiento de la septicemia, neumonía, meningitis.

Bibliografía:

- www.imedicinas.com/GPTage/Obrir.php?id=ca05se01sb02gm01 → Cefalosporina.
- www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/druginfo/meds/a682098-es.html → Tetraciclina
- www.Penicilina.org → Penicilina.
- Vademécum Académico de Medicamentos - Quinta edición - Editorial: MCGRAW HILL - Año de edición: 2009

↓
Todos los medicamentos excepto antibióticos.